

Pflanzenschutzwarndienst

Obstbau

>> Fachstelle Obstbau

Niederstamm Kernobst **Schorf**

In schorffreien Parzellen im Vorsommer SSH-Präparate oder Strobilurine in Kombination mit einem Kontaktfungizid wie Delan, Atollan, Legan, Rucolan oder Captan einsetzen mit gleichzeitiger Wirkung gegen Schorf und Mehltau. Ebenfalls möglich sind Kontaktfungizide gegen Schorf in Kombination mit einem spezifischen Mehлтаumittel wie Nimrod, Pican, Cidely oder Topas, Topas Vino. In Anlagen mit Schorfbefall nur Kontaktfungizide im Abstand von ca. 8-10 Tagen verwenden.

Apfelwickler Niederstammanlagen

Der Flug, die Eiablage und der Larvenschlupf sind im Gange. Eine 2. Behandlung ist nach Ablauf der Wirkungsdauer der 1. Behandlung nach ca. 2-3 Wochen zu wiederholen. Mittelwahl: Affirm, Affirm Profi, Atac Rapid oder Zorro.

Kleiner Fruchtwickler

Der Flug, die Eiablage und der Larvenschlupf sind im Gange. Eine Bekämpfung sollte in Befallslagen/Parzellen erfolgt sein. Mittelwahl: Affirm, Atac, Rapid, Audienz oder Elvis mit gleichzeitiger Wirkung gegen den Apfelwickler.

Grüne Apfelblattlaus

Kulturen, insbesondere Junganlagen, laufend überwachen. Bei Überschreiten der Schadenschwelle von 5-10% befallenen Langtrieben eine Behandlung vornehmen. Mittelwahl: Pirimor, Teppeki.

Kirschen (Kulturen und Hochstämme) Fruchtmonilia, Bitterfäule

Vor der Ernte sind bei Kirschen je nach Witterung 1-2 Behandlungen gegen die Fruchtmonilia und die Bitterfäule zu applizieren. Mittelwahl: Teldor+Delan, Prolectus+Delan oder Flint+Moon Privilege. Wartefristen beachten. Zur Vermeidung von Spritzflecken nur trockene Bäume behandeln. Bezüglich Mischbarkeit der Produkte mit Insektiziden stets Gebrauchsanweisung beachten.

Kirschenfruchtfliegenbekämpfung

Eine 2. Behandlung 2 Wochen vor der Ernte vornehmen. Mittelwahl: Gazelle, Oryx Pro, Pistol, Barritus Rex, Movento SC.

Wartefristen: für alle oben genannten Mittel: 2 Wochen, eingesetzt gegen die Kirschessigfliege beträgt die Wartefrist 1 Woche.

Kirschessigfliege

7 Tage vor der Ernte ist eine Behandlung mit Audienz vorzusehen. Eine weitere Behandlung ist insbesondere bei grossen Sortenblöcken zwischen der ersten und zweiten Lese unter Einhaltung der Wartefrist zu applizieren.

Zwetschgen: Zwetschgenrost

Bei Zwetschgen sind mindestens 2 Behandlungen gegen Zwetschgenrost im Abstand von ca. 14 Tagen zu applizieren. Mittelwahl: Delan + Netzschwefel. Netzschwefel nicht bei heissen Temperaturen über 25°C anwenden.

Pflaumenwickler

Für eine Bekämpfung der 2. Generation ist es noch etwas zu früh. In frühen Lagen ist eine 1. Behandlung nächste Woche vorzusehen. Details folgen am kommenden Montag.

Äpfel (Hochstämme Feldobstbau) Apfelwickler

Eine erste Behandlung mit Zorro sollte erfolgt sein. Eine 2. Behandlung ist 4 Wochen nach der ersten Behandlung vorzunehmen. Mittelwahl: wiederum Zorro.

Zu beachten: Allfällige Auflagen von Handelsbetrieben bezüglich der Mittelwahl und Einsatzzeitpunkt der Mittel sind zu beachten.

Kirschenpreise

Tafelkirschen (lose, ohne Gebinde/kg)

24 mm +	ab Erntebeginn	Fr. 5.90
28 mm +	ab Erntebeginn	Fr. 7.30

Brennkirschen

Das Produktzentrum Destillate hat folgende Richtpreise für Brennkirschen festgelegt:

franko Brennerei, bei 18% Brix, geliefert in eigenen Fässern
Suisse Garantie Fr. 1.35/kg

Industriekirschen

Je nach Menge handgepflückt oder Schüttelware und Hochstamm Suisse zertifiziert.
Fr. 1.90 bis Fr. 2.25 pro kg.

Hollenstein Richard
Fachstelle Obstbau

Landw. Zentrum SG
Mattenweg 11
9230 Flawil

T 058 228 24 76
richard.hollenstein@sg.ch
www.lzsg.ch